



遠離毒品



反毒總動員

-【紫錐花運動】



紫錐花運動
Echinacea Campaign

馬英九總統於101年6月2日出席
101年反毒會議之反毒博覽會時

，在民間團體、教育部蔣偉寧部長及 總統傳遞揮舞「紫錐花運動」旗幟，
宣示「紫錐花運動」，由校園推向社會，由國內推向國際，全球一起來，並
爭取國際認同此一反毒意象及作為永久反毒代稱。

「**紫錐花**」係北美菊科植物紫錐菊，為北美印地安人治療蛇、蟲咬傷敷料，
晚近歐美企業予以製成健康食品，以其具有內服外敷之「健身」、「提升自
我防護力」的意象，故引為「反毒」的代表花卉。



防制藥物濫用宣導

一般而言，任何服用成癮的東西就是毒品，但在醫學上，絕大多數毒品是可以用來治病的。藥物濫用係指凡不是為了治療目的，未經醫師的處方或指示，過度且強迫地使用某種藥物，其程度足以傷害個人健康、影響社會及職業適應，甚至危害到社會秩序，即稱為「藥物濫用」。

(一) 我國藥物濫用簡史：

光復前：鴉片

民國五十年代：強力膠

民國六十年代：速賜康

民國七十年代：紅中、青發、白板

民國七十九年以後：安非他命

目前：安非他命、海洛因、FM2 安眠鎮靜劑、強力膠、快樂丸（MDMA）、大麻、愷他命（ketamine）

(二) 濫用藥物之成因

1.個人因素

- 人格發展缺陷或偏差
- 好奇及尋求刺激

2.環境因素

- 家庭方面
- 醫源性
- 社會地位
- 社會風氣

3.教育因素

4.社會因素

5.較易染上毒藥癮的特徵

- 生活沉悶無目的
- 自信心不足
- 家庭不和諧
- 與濫用者為友

●缺乏成就感

(三) 藥物濫用者行為表徵

- 1.情緒方面：多話、躁動不安、沮喪、好辯
- 2.身體方面：思睡、食慾不振、目光呆滯、結膜紅腫、步履不穩、靜脈炎
- 3.感官表達方面：視幻、聽幻、無方向感
- 4.社會適應方面：多疑、誇大、好鬥、無理性行為、缺乏動機

(四) 學校藥物教育之目的

- 1.增進學生對正確用藥知識及藥物濫用的認知
- 2.正確認識藥物對人體身心健康的影響
- 3.培養學生積極的生活態度，抗拒藥物的誘惑
- 4.培養解決問題及抗拒同儕使用藥物壓力的方法
5. 政確認知藥物濫用有關的法令規章

拒絕毒品的方 法

1. 勇敢說不，語氣堅定。
2. 告訴提供者吸毒對健康的重大危害。
3. 告訴提供者毒癮發作的痛苦。
4. 告訴提供者吸毒是違法行為，並有刑責。
5. 建議做點別的事情。
6. 藉故離開現場。

毒 品 的 諮 詢 及 輔 導 機 構

- 行政院衛生署藥政處 (02)23210151
- 行政院衛生署麻醉藥品經理處 (02)23952279
- 中華民國反毒運動促進會 (02)23895995
- 財團法人基督教晨曦會 (02)29270010
- 全省各地衛生局、張老師、生命線、榮譽觀護人協進會