

考試科目	基本護理學	請於答案卷作答	請填准考證號碼
※題目卷及答案卷請一併繳回			
單選題：			
01. 呂先生因腸阻塞手術後，現有小腸引流管留置，每日引流量約為 2,800 c.c. 以上，抱怨手指有麻刺感，且覺疲倦，外觀顯得軟弱，脈搏不規則但血壓正常，請問呂先生可能缺少何種電解質？(A) 鈉離子 (B) 鉀離子 (C) 鈣離子 (D) 氯離子。			
02. 會談過程中，張先生對護理人員說：「我覺得很難過，我真的很難過。」護理人員回答：「您很難過是指……」，護理人員所應用的通技巧為：(A)總結 (B)澄清 (C)反映 (D)猜測。			
03. 有關肌肉注射的敘述，下列何者正確？(A)注射部位應選擇血管分佈較多、且肌肉層較厚之處，以利吸收 (B)在執行注射給藥時，必須以內科無菌技術操作 (C)一般採 Z 字型注射法，主要目的是減少注射時疼痛 (D)2 歲前幼童最佳的注射部位為大腿股外側肌			
04. 醫囑：Dulcolax 1# P.O. h.s. & Dulcolax supp 1# c.m.。正確的部分為：(A) 今天睡前，由舌下給予 1 顆 Dulcolax 錠劑 (B) 明天一大早，口服 1 顆 Dulcolax 錠劑 (C)今天睡前，由直腸給予 1 顆 Dulcolax 栓劑 (D) 明天一大早，由直腸給予 1 顆 Dulcolax 栓劑。			
05. 王小姐每小時靜脈輸液量 100 c.c.，輸注時間為白班與小夜共 16 小時，使用微滴套管輸注，平均每分鐘滴速應控制為多少滴最適當？(A) 11 (B) 31 (C) 50 (D) 100			
06. 下列何者是病人入院時，護士應最先採取的護理措施？(A)環境介紹 (B)醫院常規說明 (C)觀察病人並測量生命徵象 (D)測量身高、體重。			
07. 以下有關脈搏的特性敘述，何者正確？(A)身材高大者，脈搏速率多較同年齡身材較小者快 (B)血壓升高時脈搏速率變快 (C)毛地黃 (digoxin) 會使速率變慢 (D)訓練有素的運動員脈搏速率較快。			
08. 下列敘述何者正確？(A)長期醫囑是指立即執行的治療或給藥，時間限制為 3 個月內 (B)臨時醫囑是指立即執行的治療或給藥，沒有僅執行 1 次的限制 (C)P.R.N. 醫囑屬於長期醫囑，給予次數通常不止 1 次 (D)S.O.S. 醫囑屬於臨時醫囑，若當時未能執行並超過 24 小時，此醫囑自動失效。			
09. 下列有關陳施氏呼吸的敘述，何者錯誤？1 呼吸有週期性暫停 2 呼吸由淺變深，如潮水之起伏 3 發生於糖尿病酮酸中毒患者 4 呼吸深度和頻率，規則地變快。(A) 1 2 (B) 3 4 (C) 2 3 (D) 1 4。			
10. 八歲的，發燒 39℃，醫囑：acetaminophen 1# supp st.，下列給藥之措施何者為非？(A) 協助採左側臥式 (B) 給藥後應請王小妹維持原姿勢 5 分鐘 (C) 塞入深度為 1-2 吋 (D) 此藥未用前應保存於冰箱內。			
11. 醫囑：「Vit.C30 mg IM st」，現 Vit.C 為 120 mg/2 ml/amp，應給幾 ml？(A)0.2(B)0.4(C)0.5(D) 2。			
12. 當病人知道自己的生命接近死亡時，常會問：「如果能讓我活到女兒結婚就好了？」，是屬於臨終心理反應的那一期？(A)震驚與否認期 (B)憤怒期 (C)討價還價期(D)接受期			
13. 下列描述何者錯誤？(A)耐受性，是指長期使用某類藥物，漸漸失去預期效果，需要增加劑量才有療效 (B)長期使用安非他命，容易造成習慣性 (C)藥物協同作用指的是兩種藥物合併使用會造成 1+1>2 的效果(D)藥物拮抗作用指的是兩種藥物合併使用會造成 1+1<2 的效果。			
14. 下列有關盤尼西林皮膚試驗的敘述，何者不正確？1 於 15-20 小時後評估結果 2 注射時須反抽有無回血 3 注射角度與皮膚呈 5~15 度角 4 紅腫直徑 20 mm，不可注射盤尼西林 5 注射後應以紅筆圈起，並寫下評估的時間。(A) 1 2 3 (B) 1 2 5 (C) 2 4 5 (D) 2 3 4。			
15. 下列哪些狀況下會使用心尖脈測量心跳速率？1 新生兒 2 有心律不整的病人 3 大量出血的病人 4 服用 digitalis 的病人 5 進行心肺復甦術。(A) 1 3 4 (B) 2 4 5 (C) 1 2 4 (D) 2 3 5。			
16. 下列有關跌倒的敘述，何者正確？1 是醫院中最常見的化學性傷害 2 最常發生於清晨及夜晚 3 對環境不熟悉的病人容易跌倒 4 老年病人必須使用約束帶以預防跌倒。(A) 1 2 (B) 2 3 (C) 3 4 (D) 1 4。			
17. 病人手術後從恢復室返回病室，護理人員需使用移位板協助病人從推床移至病床。此時應如何調整兩床的高度最為理想？(A) 推床調至腰間，病床調至最低 (B)推床高度高於病床 (C)推床高度低於病床 (D)兩床高度調為等高			
18. 有關護理評估的敘述，下列何者最正確？(A)病人過去與現在的資料都很重要 (B)為達評估項目的完整性，可忽略病人感受 (C)目前流行的護理模式是評估病人的最佳工具 (D)為確認所收集資料的真實性，應以檢驗報告為主。			
19. 王先生 65 歲，因大腿骨折而住院，他告訴護士：「我全身都感覺酸痛，怎麼辦？」此時護士最先要作的護理處置為何？(A)報告醫師，開止痛藥 (B)告訴病人這是因骨折所引起，等骨折痊癒就會改善 (C)給病人作全身按摩 (D)評估病人的姿勢、擺位、床墊是否恰當。			
20. 入院新個案主訴上下樓梯時左側膝關節輕微酸痛，此時護理人員針對個案關節的評估方法，下列何者正確？(A)請個案先熱敷後再做評估 (B)避免執行膝關節觸診 (C)只能做主動運動的評估 (D)需比較兩側關節的活動度。			
21. 下列哪一種漱口水，最適於口腔潰瘍者於飯前使用，可減輕疼痛？(A)Dobell's solution (B)xylocaine solution (C)boric acid solution (D)sodium bicarbonate solution。			
22. 下列何項個案主訴最能呈現其良好的睡眠狀態？(A)「昨晚一共睡了 6 小時」 (B)「上床後不到 10 分鐘就睡著了」 (C)「每天睡前都有吃一顆安眠藥」 (D)「早上醒來後感覺精神飽滿、愉快」。			
23. 執行“absolute bed rest”醫囑時，下列何者錯誤？(A)此醫囑又稱為完全臥床休息 (B)除下床如廁外均應臥床休息 (C)其目的是為了緩解症狀、降低新陳代謝、減輕耗氧量 (D)日常活動均應限制於床上執行，且完全由他人代理。			

考試科目	基本護理學	請於答案卷作答	請填准考證號碼_____
------	-------	---------	--------------

24. 協助長期臥床病人由床上移至輪椅的活動順序，下列何者適當？①檢視床輪是否固定②測量病人的生命徵象③協助病人坐於床緣④將輪椅推至床尾呈45度角放置固定⑤環抱病人轉身坐於輪椅。(A) ①→③→②→④→⑤ (B) ②→①→③→④→⑤ (C) ②→①→④→③→⑤ (D) ①→④→③→②→⑤。
25. 下列為成年病人插鼻胃管前，插入長度的測量方法，其中何者正確？(A)眉間至劍突距離之長度 (B)眉間至劍突與臍中點距離之長度 (C)鼻尖經耳垂至劍突與臍中點距離之長度 (D)鼻尖經耳垂至劍突處之長度。
26. 陳先生主訴解便之顏色異常（暗似柏油），下列可能情況之敘述，何者除外？(A)上腸道出血 (B)胃出血 (C)服用鐵劑 (D)腸道攝影檢查服用硫酸鋇所致。
27. 人體的排便中樞位於何處？(A)頸神經 C<sub>2</sub>～C<sub>4</sub>(B)胸神經 T<sub>2</sub>～T<sub>4</sub>(C)腰神經 L<sub>2</sub>～L<sub>4</sub>(D)薦神經 S<sub>2</sub>～S<sub>4</sub>。
28. 腹壓增加時即排出少於 50c. c. 尿液，稱為(A)溢尿性尿失禁(B) 壓力性尿失禁(C) 急迫性尿失禁(D) 完全性尿失禁。
29. 王同學上體育課時，不小心將踝關節扭傷，造成疼痛腫脹，可立即予以何種繃帶包紮及合適護理？(A)彈性繃帶、熱敷扭傷處 (B)橡皮繃帶、加壓預防腫脹惡化 (C)絨布繃帶、抬高患肢 (D)彈性繃帶、抬高患肢。
30. 過量或長期飲酒者，容易造成哪一種維生素的缺乏？(A)維生素 A (B)維生素 B (C)維生素 C (D)維生素 D。

二、簡答題(共 40 分)

病人 55 歲男性，曾結婚育有二子女，但失聯已約十餘年，病人平時自己獨居於台灣山區，因意外跌傷，經診斷為脊椎損傷，入院後僅有一名妹妹願意出面探視案主，醫師建議病人因脊椎損傷，呼吸不順暢，醫師建議執行氣切，但家屬(案主妹妹)與病人均拒絕醫療。

1. 案主妹妹內心會有哪些理由與掙扎？
2. 您覺得針對此個案，醫護有哪些需必要告知病人的重點？